

老狗依賴型糖尿病的症狀

跟人類一樣，狗狗的糖尿病也分為兩類，這裏我們只講老狗易得的 2 型糖尿病，它是因後天因素的獲得性疾病，狗狗依賴胰島素導致，也被稱為胰島素依賴型糖尿病。通常發生在老狗 7-10 歲之間。

2 型糖尿病的發生是隨著狗狗年齡的增長，狗的胰腺分泌胰島素不能適當調節狗狗的糖的攝入水準。尤其在大型犬和超重的狗中更為常見。而絕育母狗狗得 2 型糖尿病的風險被認為是最高的。

如果你的狗狗有以下症狀，我們建議主人及時就醫檢測是否得了糖尿病：

多吃、多喝、多尿、體重減少的症狀。體重增加、尿道發炎和早期白內障，而且狗狗的皮膚也會變差以及常併發脂血症及急性胰臟炎。

超重的狗更容易得糖尿病。同時，肥胖的狗狗還會產生胰島素抵抗，這使得胰島素治療並不會起大很大的效果。糖尿病的老狗狗一定要控制好體重。

一般是通過獸醫進行血液測試來診斷老狗是否患有糖尿病的，獸醫會透過血糖測試和尿液葡萄糖測試來證實犬只是否患上糖尿病。正常動物的葡萄糖水準介乎 5 至 15mmol/L 之間，而葡萄糖水準超出 20mmol/mL 或在尿液找到葡萄糖的動物皆屬於不正常和有機會患上

糖尿病。